

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Оксимик Плюса для лечения крупного рогатого скота и свиней при болезнях бактериальной этиологии

1. Состав и форма выпуска

Торговое наименование лекарственного препарата: Оксимик Плюс (Oximic Plus).
Международное непатентованное наименование: окситетрациклин, диклофенак. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

В качестве действующего вещества в 1 мл препарата содержится:

Окситетрациклина гидрохлорид - 200 мг.

Диклофенак натрия – 5 мг.

Вспомогательные вещества:

2-Пирролидон - 400 мг.

Поливинилпирролидон (PVP K 17) - 50 мг.

Магния хлорида гексагидрат – 88 мг.

Натрия формальдегид сульфоксилат – 4 мг.

Моноэтаноламин – 87 мг.

Бензиловый спирт – 10 мг.

Пропиленгликоль – 200 мг.

Вода для инъекций - до 1 мл.

Оксимик Плюс по внешнему виду представляет собой прозрачную маслянистую жидкость бесцветного или светло-желтого цвета. Препарат выпускают в стеклянных и пластиковых флаконах по 100, 250 и 500 мл. Стерильно.

2. Фармакологические свойства

Оксимик Плюс относится к антибактериальным и противовоспалительным лекарственным препаратам.

Окситетрациклин - это антибиотик широкого спектра действия с бактериостатическими свойствами, который действует путем ингибирования синтеза белка микроорганизмов. Он действует на грамотрицательные и грамположительные бактерии, микроплазмы, хламидии, риккетсии и некоторые простейшие и грибы. После того как во внутренней части клеток окситетрациклин связывается с рецептором бактериальной 30 S рибосомы, это эффективно предотвращает инкорпорацию аминокислот, которые находятся в пептидной цепи, и синтез белка.

Поглощенный окситетрациклин хлоргидрат проходит через весь организм и выводится с мочой без изменения. В меньшей степени выводится из организма с желчью. Так как он реабсорбируется в кишечнике, то длительность его нахождения в организме увеличивается. Благодаря используемому носителю достигается длительный терапевтический эффект в течение 4 дней после одного применения.

Диклофенак – это нестероидный, противовоспалительный агент, полученный из фенилуксусной кислоты. Диклофенак совместно с антибиотиком позволяет устранять воспаления и отеки, облегчая действие антибактериального агента. Диклофенак действует путем ингибирования фермента циклооксигеназы, который вмешивается в превращении арахидоновой кислоты в циклические эндопероксиды.

Диклофенак натрия быстро реабсорбируется при внутримышечном введении что позволяет достичь максимальных плазматических концентраций через несколько минут после применения. Главным образом выводится при метаболизме в моче, также выводится с желчью.

Оксимик Плюс по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

3. Показания к применению

Оксимик Плюс применяют крупному рогатому скоту, свиньям, козам и овцам для лечения болезней, вызванных инфекциями, чувствительными к окситетрациклину и как противовоспалительное средство.

Оксимик Плюс действует на грамположительные и грамотрицательные бактерии, микоплазмы, хламидии, риккетсии и некоторые простейшие и грибы.

4. Способ применения и дозы

Внутримышечно, подкожно. Однократно. Перед применением тщательно встряхнуть.

Препарат применяют в дозе 1 мл на 10 кг живого веса. Поросятам препарат вводят подкожно.

При необходимости инъекцию повторяют через 3-5 дней.

5. Период ожидания

Мясо: 28 дней, молоко - 7 суток.

6. Противопоказания

Гиперчувствительность к действующим веществам препарата.

7. Особые указания

Не применять по истечении срока годности.

Не применять лактирующим животным.

8. Взаимодействие с другими лекарствами и другие формы взаимодействия

Не допускается одновременное применение Оксимик Плюс с бактерицидными препаратами, кортикостероидами, а также смешивание в одном шприце с другими лекарственными препаратами.

9. Побочные эффекты

При применении Оксимик Плюс в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается.

10. Передозировка

В случае значительной передозировки у животных возможен анафилактический шок.

11. Срок годности и условия хранения

Срок годности - 3 года с даты выпуска. Хранить продукт плотно закрытым, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, вдали от нагревательных приборов и источников огня, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°C до +25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

12. Условия отпуска

Без рецепта ветеринарного врача.

13. Меры личной профилактики

При попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо смыть струей проточной воды.

При введении препарата себе обратиться за медицинской помощью и показать вкладыш врачу.

ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

Регистрационное удостоверение № РК-ВП-4-3535-18 выдано «Лабораториос Микросулес Уругвай С.А.», Восточная Республика Уругвай, 91001 Канелонес, рута 101 км 28, Камино аль Пасо Эскобар б/н.

Организация-производитель: «Лабораториос Микросулес Уругвай С.А.», Восточная Республика Уругвай, 91001 Канелонес, рута 101 км 28, Камино аль Пасо Эскобар б/н.

Представитель/импортер в РФ: ООО «ГД «РостАгроВет», 143602, Россия, Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Ямская, 17Б.